По наблюдениям китайских ученых из Городского университета Гонконга, Сиань Цзяотун-Ливерпульского университета и других исследовательских центров, подобные меры практически бесполезны. Ученые проанализировали метеорологические данные и сведения о ежедневной смертности в Гонконге за 2008–2017 год. Как выяснилось, при повышении температуры на 1 свыше 29,61 °С смертность увеличивалась на 5,7% в районах с низким уровнем озеленения, на 5,4% — в районах со средним уровнем озеленения и 4,6% — с высоким уровнем. Для районов, расположенных вблизи водоемов, показатели смертности составили 7,5% в районах с малым количеством водных пространств и 3,5% — с большим их количеством. «В Гонконге не наблюдалось значительного влияния зеленых и синих зон на риск смертности, связанной с жарой. Эти результаты ставят под сомнение существующие данные о важной защитной роли зеленых и синих пространств в снижении рисков смертности, связанных с повышением температуры», — заявили авторы работы. Однако результаты, полученные в Гонконге, не следует распространять на другие территории, считает руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич. По всей видимости, дело не в неэффективности подхода, а в особенностях расположения самого региона.

Подробнее: https://pogoda.mail.ru/news/52533168/